

Favor DUO

GARLON2000 /Produktinformationen

Herbizid zur Einzelstockbehandlung von Sträucher und zur Bekämpfung ausdauernden Unkräuter wie Disteln und Brennnesseln. Wird rasch von den Pflanzen aufgenommen. Sichere Wirkung dank Wirkstoffkombination. Geeignet für Strunkbekämpfung.

Wirkstoff

60 g/l Triclopyr; 28,8 g/l Fluroxypyr-meptyl; Microemulsion (ME)

Anwendung

Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst):

Strunkbehandlung

30%; 300 ml Favor DUO in 700 ml Wasser auf die frischen Schnittflächen ausbringen. 1 l Brühe pro 1 m² Schnittfläche. Bester Bekämpfungserfolg im Herbst.

Brachland / Humusdeponien

2%; 200 ml Favor DUO in 10 l Wasser zur Einzelstockbehandlung gegen Brombeersträucher, Grosse Brennnessel, Ampfer-Arten und mehrjährige Disteln. Anwendung während einer aktiven Wachstumsphase der Unkräuter. Bester Bekämpfungserfolg bei Anwendung zum 2. Aufwuchs im Frühsommer.

Wirkung

Triclopyr und Fluroxypyr gehören zu den Pyridincarbonsäuren. Diese werden über die Laubblätter aufgenommen und gelangen mit dem Saftstrom über den Hauptspross zu den Vegetationskegeln in Wurzel und Spross. Hier stimulieren beide Wirkstoffe das Zellwachstum und stören den Eiweissstoffwechsel. Das führt zu den typischen Absterbesymptomen (Chlorosen, deformierte Blätter und verdrehter Wuchs).

Wirkungsspektrum

Gut erfasst werden: Adlerfarn, Apfel, Birne, Ahorn, Ambrosia, Brennnessel, Brom-/Himbeeren, Blacken, Birken, Buche, Disteln, Eiche, Erlen, Flieder, Ginster, Haselnuss, Holunder, Kastanie, Klee-Arten, Kornelkirsche, Linde, Löwenzahn, Minze, Pfaffenhütchen, Pappel, Rosen, Winden, Vogelbeeren, Weiden-Arten, Zwetschge/Pflaume. Nicht ausreichend erfasst werden: Baumnuss, Efeu, Hahnenfuss, Kirsche, Schachtelhalm, Gräser.

Sicherheit

Vorsicht gefährlich / Gewässergefährdend

Unbedingt Vorschriften betreffend Lagerung, Entsorgung und Erste Hilfe-Massnahmen sowie Gefahrhinweise und Sicherheitsratschläge auf der Packung oder dem Sicherheitsdatenblatt beachten. Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigelegte Gebrauchsanweisung.

Hinweis

Vorsicht: Schäden an Nutz- und Zierpflanzen möglich! Jede Abdrift auf Nutz- und Zierpflanzen vermeiden. Nicht im Wurzelbereich von Zierpflanzen (Bäumen, Sträucher, Stauden, Blumen usw.) einsetzen. Für die Anwendung zur Strauch- oder Unkrautbekämpfung muss genügend Blattmasse vorhanden sein. Die Wirkung wird durch Niederschläge nicht beeinträchtigt, wenn diese später als 3 Stunden nach der Behandlung erfolgen. Optimalste Wirkung bei wüchsigen Bedingungen, aber nicht bei Temperaturen über 25° C. Die Wartefrist für eine Wiederbepflanzung einer mit Favor DUO behandelten Fläche beträgt 8 Wochen.

Beachten

Der Verbraucher trägt das Risiko für Schäden, die auf Umstände zurückzuführen sind, auf die der Hersteller keinen Einfluss hat. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab für Schäden, die aus unsachgemässer Lagerung oder Anwendung des Produktes entstehen

Packungen

5 dl Dosierflasche (+ 1 Pinselflasche gratis) | 2,5 l (+ 2 Pinselflaschen gratis)